



Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Porodnická a gynekologická klinika

Poučení pacientky o cerkláži

Pacientka Rodné číslo.....
jméno příjmení titul

oddělení
(ambulance)

jmenovka

Vážená paní, slečno,

vybrala jste si naše zdravotnické zařízení k provedení cerkláže na děložním hrdle.

Cerkláž (někdy cerclage), je výkon na děložním hrdle.

Spočívá v založení cirkulárního (kruhovitého) stehu kolem hrdla děložního ve výši vnitřní branky. Cílem cerkláže je zabránit vzniku nebo progresi nedostatečnosti hrdla děložního a předčasnému porození, nebo potracení plodu.

Cerkláž provádíme **preventivně**, obvykle mezi 16.-20.týdnem těhotenství v případě, že z anamnézy pacientky víme o zvýšeném riziku vzniku nedostatečnosti děložního hrdla nebo u dvojčat.

Terapeuticky cerkláž provádíme, obvykle mezi 20.-26. týdnem těhotenství, tedy v okamžiku, kdy je nedostatečnost hrdla zjištěna.

Rizika výkonu rozdělujeme podle času vzniku na :

- bezprostřední (vzniklá při výkonu) – poranění hrdla děložního, poranění močového měchýře, krvácení, předčasný odtok vody plodové
- časné (vzniklé do 6. týdnů po výkonu) – vznik děložních stahů (kontraktí), vyvolání předčasného porodu nebo potratu
- pozdní (po 6 týdnech od provedení výkonu, většinou v příštím těhotenství) - nedostatečnost děložního hrdla, riziko předčasného porodu nebo potratu plodu

Alternativy výkonu:

- farmakologické – podání léků tlumících děložní stahy
- režimová opatření – hospitalizace pacientky a přísný klidový režim trvajících i několik týdnů
- mechanická – zavedení poševního pesaru

Pro snížení možných komplikací dodržujte doporučení lékaře:

- přiměřený klidový režim po zákroku
- zákaz pohlavního styku
- pravidelné kontroly v poradně pro rizikové těhotenství ve spádovém zdravotnickém zařízení
- v případě nástupu děložních stahů je nutná okamžitá kontrola ve spádovém zdravotnickém zařízení, nebylo-li dohodnuto jinak. Nepodaří-li se děložní stahy farmakologicky utlumit je doporučeno steh cerkláže neprodleně odstranit.
- Steh cerkláže se obvykle po dokončení 36.týdnu těhotenství odstraňuje
- V případě jakýchkoliv obtíží kontrola ve spádovém zdravotnickém zařízení nebo na ambulanci porodnické a gynekologické kliniky kdykoliv.

Byla jsem srozumitelně seznámena s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. Byla jsem poučena o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací.

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčela žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby.

Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dnev.....hod .

.....

Podpis pacientky

Hradec Králové dnev.....hod.

.....
Jmenovka a podpis lékaře/řky

/x/ vyplní zdravotnický zaměstnanec, nehodící se škrtně