



Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
I. interní klinika

FAKULTNÍ NEMOCNICE
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ
I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA
1123 - lůžkové oddělení C
IČ: 00179906, tel.: 49583 3243, 2769

Souhlas pacienta/tky s výkonem - Souhlas s provedením drenáže/punkce tělesných dutin

Pacient/ka /x/ Rodné číslo.....
jméno příjmení titul

Důvod výkonu

Provedení drenáže či punkce tělesných dutin se provádí za účelem léčebným nebo diagnostickým. V zásadě lze rozdělit tyto výkony na punkci/drenáž pohrudniční dutiny a břišní dutiny. Oba výkony se provádějí v místním znecitlivění kůže v místě vpichu. Po znecitlivění lze buď jednorázově jehlou, k tomuto úkonu určenou, odsát obsah z pohrudniční či břišní dutiny, nebo lze do těchto lokalit zavést speciální katétr (hadičku), kterou lze delší dobu obsah dutin odsávat. Přestože je tento výkon prováděn rutinně, je spojen s rizikem komplikací, které jsou obvykle málo závažné, ve výjimečných případech ale mohou mít i život ohrožující charakter.

Málo závažnou komplikací při punkci/drenáži pohrudniční dutiny je krvácení v místě vpichu či vznik krevní sraženiny v tomto místě, které je obvykle řešeno stlačením místa vpichu.

Při hrudní punkci může dojít ke vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny - tzv. pneumothoraxu, při kterém dojde ke svinutí plic a zhoršení výměny vzduchu v takto svinuté plíci. Tato komplikace se vyskytuje při méně než 2% hrudních punkcí a je řešena krátkodobým (zhruba na dobu 48 – 72 hod) zavedením trubičky (tzv. hrudní drén) do pohrudniční dutiny a odsátím vzduchu, které vede k opětovnému rozvinutí plic. Závažnější komplikací je poranění plic spojené s krvácením do pohrudniční dutiny. I zde je nutné zavedení hrudního drénu do pohrudniční dutiny a odsátí krve, operační řešení je nezbytné zcela výjimečně. Ve vzácných případech může dojít ke vniknutí infekce do pohrudniční dutiny, které je řešeno podáváním antibiotik, pokud dojde ke vzniku opouzdřeného hnisavého ložiska, pak odsátím tohoto ložiska s event. výplachy antiseptickými roztoky.

Při punkci/drenáži břišní dutiny může dojít k místním komplikacím obdobného charakteru jako u hrudní punkce/drenáže. Ve vzácných případech může dojít k poranění parenchymových nitrobřišních orgánů (játra, slezina, ledvina) nebo cév, které je spojeno s krvácením do dutiny břišní, tuto komplikaci je většinou nutné řešit chirurgicky. Ojediněle může dojít k poranění dutých orgánů (střevo), při kterém hrozí proniknutí střevního obsahu do dutiny břišní a vznik zánětu pobřišnice – i zde je nutné většinou operační řešení.

K plánovanému výkonu není adekvátní alternativa.

Po výkonu nebudete nijak omezeni.

Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací.

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí.

Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dnev.....hod .

.....
Podpis pacienta/ky

Hradec Králové dnev.....hod.

.....
Jmenovka a podpis lékaře/ky