



Aplikace nízkomolekulárního heparinu pacientem

1. Pohodlně se posadte nebo si lehněte.



2. Odezinfikujte místo vpichu.



3. Odstraňte kryt jehly z předplněné injekční stříkačky.



8. Uchopte ochranný kryt stříkačky a posuňte ho, než uslyšíte cvaknutí.

- Před použitím si **umyjte ruce a nedotýkejte se jehly**, zabraňte kontaminaci okolím
- Odstraňte ochranný kryt jehly
- Z injekční stříkačky **neodstraňujte vzduchovou bublinu**, její přítomnost je žádoucí
- Léčivou látku z injekční stříkačky aplikujte vždy do **spodní či boční části břicha**, minimálně **5 cm od pupku**
- Po aplikaci zabezpečte stříkačku proti opětovnému píchnutí **posunutím ochranného krytu**
- Střídejte místa vpichu
- Po aplikaci místo vpichu **nemasírujte**
- Injekční stříkačky s léčivem uchovávejte při teplotě do 25 °C
- Injekční stříkačky s léčivem uchovávejte **mimo dosah dětí**
- Použité stříkačky **nehazujte do domácího odpadu**, ale vraťte do lékárny či lékaři, který vám lék předepsal

4. Udělejte si na břiše kožní řasu.



7. Po vyprázdnění celého obsahu stříkačky jehlu vytáhněte a poté uvolněte kožní řasu.

6. Aplikujte pomalu celé množství účinné látky. Kožní řasu držte po celou dobu aplikace.

5. Celou jehlu zaveďte kolmo do kožní řasy.

