Ústav klinické mikrobiologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové; IČO 00179906
Tel.: 495 833 149, e-mail: ukm@fnhk.cz

Průvodní list mikrobiologického vyšetření
VIROLOGIE

Vyplní žadatel

Rodné číslo: | **Poj.:**

Příjmení:

Jméno titul:

Adresa pobytu v ČR:

Dg.: | **Pohlaví:** ☐ Muž / ☐ Žena

Datum odběru: | **Čas odběru:**

Datum prvních příznaků onemocnění: | **STATIM:** ☐

Těhotenství (týden):

Očkování ve vztahu k vyšetření:

Cestovní anamnéza:

Vyplní laboratoř

Přijal:

Dne: | **Čas:**

Číslo žádanky:

Razítko odesílatele včetně IČZ/IČP a odbornosti:

Podpis:

VIROVÉ HEPATITIDY – 5 ml srážlivé krve
(CMV a EBV žádejte zvlášť)

HAV, virová hepatitida A ☐	IgG ☐ IgM ☐
HBV, virová hepatitida B ☐	HBsAg ☐ anti HBs ☐
	HBeAg ☐ anti HBe ☐
	anti HBc total ☐ IgM ☐
HCV, virová hepatitida C ☐	anti HCV ☐
HEV, virová hepatitida E ☐	IgG ☐ IgM ☐

RETROVIRY – 5 ml srážlivé krve

HIV 1, 2	protilátky + antigen p24 ☐
HTLV I, II	protilátky ☐

HERPETICKÉ VIRY – 5 ml srážlivé krve

HSV 1,2; herpes simplex virus	IgG ☐ IgM ☐
	HSV 2 IgM ☐
VZV, varicella-zoster virus ☐	IgG ☐ IgM ☐
CMV, cytomegalovirus ☐	IgG ☐ IgM ☐ Avidita ☐
EBV, Epstein-Barrové virus	heterof. protilátky ☐
	VCA IgG ☐ IgM ☐
	EBNA - 1 IgG ☐ IgM ☐

NEUROINFEKCE – 5 ml srážlivé krve / likvor 0,5 ml
(herpetické viry a enteroviry žádejte zvlášť)

klíšťová encefalitida – sérum ☐	IgG ☐ IgM ☐
– likvor ☐	IgG ☐ IgM ☐
klíšťová encefalitida RAPID likvor ☐ sérum ☐	IgM ☐
příušnice ☐	IgG ☐ IgM ☐

EXANTEMATICKÉ VIRÓZY – 5 ml srážlivé krve
(herpetické viry a enteroviry žádejte zvlášť)

zarděnky ☐	IgG ☐ IgM ☐
parvovirus B19 ☐	IgG ☐ IgM ☐
spalničky ☐	IgG ☐ IgM ☐

ENTEROVIRY – 5 ml srážlivé krve

VNT (virus neutralizační test) coxsackie viry B1-B6 Ig ☐

Pro VNT zasílejte dvojice sér odebraných v rozmezí 2–3 týdnů

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ – 5 ml srážlivé krve

SARS CoV-2 **nukleokapsidový antigen** ☐	
SARS CoV-2 **protilátky** ☐	IgG-N ☐ IgG-S ☐ IgM ☐ IgA ☐
Mycoplasma pneumoniae ☐	IgG ☐ IgM ☐ IgA ☐
Chlamydia pneumoniae ☐	IgG ☐ IgA ☐
Chlamydia pneumoniae ☐	IgG ☐ IgA ☐ (WB; westernblot)
Chlamydia psittaci ☐	IgG ☐ IgA ☐ (WB; westernblot)

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ – PRŮKAZ ANTIGENU, PCR*

stěr nosohltan ☐	Ag chřipka: A ☐ chřipka B ☐
aspirát ☐ nebo BAL ☐	PCR* chřipka: A ☐ chřipka B ☐
(pro vyšetření všech antigenů 1 ml)	adenovirus ☐
	RSV ☐

* v době epidemie

***CHLAMYDIA PNEUMONIAE* – PRŮKAZ ANTIGENU**

aspirát ☐ BAL ☐

BAL bronchoalveolární laváž

***CHLAMYDIA TRACHOMATIS* – PRŮKAZ ANTIGENU** (nátěr na sklíčku)

oko P ☐ oko L ☐ moč. trubice ☐ děložní čípek ☐ jiné ☐

CHLAMYDIA TRACHOMATIS – 5 ml srážlivé krve

Chlamydia trachomatis ☐	IgG ☐ IgA ☐
Chlamydia trachomatis ☐	IgG ☐ IgA ☐ (WB; westernblot)

TRÁVÍCÍ SYSTÉM

vzorek stolice (cca 1 g)	rotaviry – antigen ☐
	adenoviry – antigen ☐
	noroviry – antigen ☐
3 následné odběry stolice u paretických onemocnění	poliovirus, izolace na buněčné kultuře ☐

KULTIVACE NA BUNĚČNÝCH KULTURÁCH

IZOLACE VIRU: HSV, VZV, CMV, ENTEROVIRY, ADENOVIRY, RSV
moč 1 ml ☐ likvor 0,5 ml ☐
punktát ☐ biopsie ☐ BAL ☐ jiné:

MTZ0028671 (verze 2021)