

Informovaný souhlas pacienta s nosním provokačním testem

Vážená paní, Vážený pane,

Váš lékař Vás doporučil k provedení nosního provokačního testu. Jedná se o vyšetření reaktivity nosní sliznice vůči konkrétním spouštěcím příčinám - např. alergenům roztočů, pylů či alergenům z Vaší profese. Vyšetření provádíme v rámci diferenciální diagnostiky, monitorování průběhu léčby (aktivita nemoci, vliv léčby) nebo pro posudkové nebo výzkumné účely.

Na Vaši nosní sliznici je možné též aplikovat konkrétní léky, např. sůl kyseliny acetylsalicylové. Dle reaktivity Vaší nosní sliznice jsme schopni určit, do jaké míry se podílejí tyto podněty na rozvoji Vašich obtíží.

Test spočívá ve změření nosní průchodnosti pomocí metody nazvané rhinomanometrie, současně jsou zhodnoceny i plicní ventilační funkce (spirometrie). Po tomto prvním měření ošetřující lékař rozhodne, zda je možné pokračovat dále v nosní provokaci.

Nosní provokace spočívá v aplikaci již určené látky, podání je buď uskutečňováno ve vodném roztoku pomocí mikropipety či danou látku při zavřených ústech vdechujete nosem (zde se jedná hlavně o profesní alergy).

V průběhu nosní provokace jsou sledovány Vaše příznaky, jako je vodnatá nosní sekrece, kýchání, slzení a pálení očí, kašel, výjimečně dochází k pocitu dušnosti. Současně v pravidelných intervalech ošetřující lékař pokračuje v rhinomanometrickém měření. Test je zastaven při rozvoji Vašich příznaků. V podstatě se jedná o příznaky, které jste sami prožili v průběhu denních činností. Vyvolání těchto příznaků svědčí pro pozitivitu nosního provokačního testu. V některých případech trvá nosní provokační test až 4 hodiny. Následující den byste již neměli být omezeni ve svých aktivitách a pracovní činnosti.

Opuštění našeho pracoviště je možné až po úpravě Vašeho stavu a hodnot plicních funkcí. Závažné život ohrožující komplikace nebyly u tohoto vyšetření zaznamenány.

Tato vyšetřovací metoda nemá v současné medicíně alternativu.

Příprava k vyšetření:

Prosíme, k vyšetření se dostavte pouze v případě, pokud jste v posledních 3 týdnech neprodělal/a infekční onemocnění dýchacích cest. Pokud ano, přeobjednejte se na tel. č.495 832104.

Od rána v den vyšetření nekuřte, neměl/a byste požit horké nápoje. Není nutné být na lačno. Aby nebylo vyšetření zkresleno, je nutné přechodně upravit Vaši medikaci (pokud neurčí Váš ošetřující lékař jinak) takto:

- Antihistaminika v tabletách (protialergické léky) vysadte 3 dny před testem
- Singulair tbl. vysadte 14 dní před testem
- Nosní antihistaminika vysadte 2 dny před testem
- Nosní kortikoidy vysadte 14 dní před testem
- Kortikoidy v tabletách vysadte 10 dní před testem
- Další léky po domluvě s lékařem

Pokud však provádíme test k ověření efektu léků, budou ponechány.

Kontraindikace testu:

Kontraindikací testu je zúžení průdušek (FEV1 <70 % náležité hodnoty) a průduškové astma, které není pod kontrolou. Kontraindikací je taktéž zánět nosních dutin, výrazná nosní neprůchodnost, výrazná přecitlivělost na spouštěcí alergen. Test neprovádíme v průběhu gravidity. Tento test by neměl být prováděn, pokud Vám byla provedena v posledních 2 měsících nosní operace či pokud Vám v posledních 6 týdnech byla podána injekční vakcína.

Byl/la jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. Byl/la jsem poučen/a se zásadami provedení nosního provokačního testu a byl/la jsem upozorněn/a na možná rizika, která jsou s provedením spojena. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací.

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/la žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu, či ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby.

Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dnev.....hod.

.....

Podpis zákonného zástupce
(je-li třeba)

.....

Podpis pacienta/tky

.....

Jmenovka a podpis lékaře/řky

Hradec Králové dnev..... hod.